

Funhit[®] emulgel

COMPOSICIÓN

Cada mL de **Funhit** emulgel contiene:

Clotrimazol.....	1.000 mg
Neomicina Sulfato.....	500 mg
Dexametasona Sodio Fosfato.....	50 mg

Llega a la raíz del Problema.

INDICACIONES:

Tratamiento tópico de las afecciones dérmicas por hongos y bacterias Gram positivas y Gram negativas en caninos, gatos, bovinos y equinos. Indicado en el tratamiento de los trastornos dermatológicos, caracterizados por inflamación con dermatitis exudativa o seca especialmente cuando son causados o se complican por infecciones bacterianas o micóticas.

Por sus componentes, **Funhit** emulgel posee actividad antimicótica, antibiótica y antiinflamatoria, lo cual lo hace indicado en el tratamiento de afecciones dérmicas como: excoriaciones, úlceras, eczemas, pápulas, pústulas, celulitis, alergias, prurito, alopecia, foliculitis, intertrigo, impétigo, otitis externa, etc. En conjunto, proporciona una terapia integral en contra de los organismos responsables en las dermatopatías.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Para uso tópico únicamente. La frecuencia de la administración dependerá de la severidad de la lesión. Aplique **Funhit** emulgel sobre el área afectada una cantidad suficiente, distribuyendo uniformemente para garantizar la absorción óptima, de dos a tres veces al día, hasta lograr la curación total o según criterio del Médico Veterinario.



CARACTERÍSTICAS:

- Principios activos altamente eficientes para una terapia para una terapia integral, que le confieren un amplio espectro de acción.
- Potencializado con aceite de Kalaya: mayor efecto antiinflamatorio, analgésico, con efectos antibacterianos y antivirales.
- Con óptimos niveles de ácidos grasos esenciales (Omegas), indicados para problemas dermatológicos.
- Regenerados celular: Acelera la cicatrización.
- Ayuda al folículo piloso en el crecimiento del nuevo pelo.
- Novedosa forma farmacéutica, que le confiere mayor extensibilidad, adaptabilidad y absorción a la superficie de la piel.
- Práctico envase, para fácil y precisa dosificación.



Con **Aceite De Kalaya**
como transportador
Transdermico

PRESENTACIÓN:

Tubo colapsible de 50 g.