

meloxic[®]

Meloxicam. 0,5% Inyectable.

meloxic 0.5 % es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINEs) inhibidor COX-2 preferencial, enzima que induce la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos responsables del dolor, la inflamación y la fiebre; ejerciendo de este modo efectos antiinflamatorios, analgésicos, antiexudativos y antipiréticos.

MELOXIC PERROS

- Es el fármaco de elección cuando el componente inflamatorio es predominante.
- Su registro de seguridad supera a los AINEs degeneraciones anteriores.
- Puede emplearse para el control del dolor post-operatorio o en casos de dolor crónico durante el período de tiempo prescrito.

MELOXIC GATOS

- Hay un potencial considerable de toxicidad sobre los AINEs en gatos, sin embargo con una dosis apropiada y a intervalos adecuados, el meloxicam se puede utilizar de manera segura.
- Se usa ampliamente para el dolor agudo en el período perioperatorio y después del trauma.



COMPOSICIÓN:

Cada mL **meloxic 0.5 %** contiene
Meloxicam 5 mg



DOSIS

PERROS:

Dosis única de 0,2 mg/kg (0,4 mL/10 kg).
Vía intravenosa o subcutánea .

GATOS:

Dosis única de 0,3 mg/kg (0,6 mL/10 kg).
Vía subcutánea

NOTA: Como continuación del tratamiento inyectable, aplicar **meloxic 0.15%** suspensión oral, a partir del segundo día, a dosis de 0.1 mg / Kg. (1 gota /kg), cada 24 horas, durante 5 a 7 días, o según criterio del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN:

Caja que contiene Frasco de 10 mL