

meloxic[®]

Meloxicam. Suspensión Oral.

meloxic[®] Suspensión Oral es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINEs) inhibidor COX-2 preferencial, enzima que induce la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos responsables del dolor, la inflamación y la fiebre; ejerciendo de este modo efectos antiinflamatorios, analgésicos, antiexudativos y antipiréticos.

DOSIS

PERROS:

Dosis única inicial de 0,2mg/kg (2gotas/kg). Vía oral, directo o mezclado con el alimento.


GATOS

Dosis única inicial de 0,3mg/kg (3gotas/kg). Vía oral, directo o mezclado con el alimento.

NOTA: Como continuación de este tratamiento vía oral ó del tratamiento con **meloxic[®] inyectable**, administrar a partir del segundo día, una dosis de 0.1mg/Kg,(En la práctica 1 gota por 1 Kg de peso), cada 24 horas, durante 5 a 7 días, o según criterio del Médico Veterinario.

COMPOSICIÓN:

Cada mL de **meloxic[®] Suspensión Oral** contiene:
Meloxicam 1,5 mg



SABOR A MIEL



MEJOR PERFIL DE SEGURIDAD

- El meloxicam ha sido identificado como el AINEs con mayor actividad antiinflamatoria frente a drogas existentes.
- No lesiona mucosa gástrica.
- No interviene en procesos de coagulación. Sus efectos renales son mínimos y transitorios.
- No incrementa el contenido de LTC₄, por lo tanto no tiene influencia en la bronco-constricción, particularidad conocida de otros AINEs.
- **meloxic[®] Suspensión Oral**, apunta hacia un doble mecanismo analgésico (periférico y central), debido a que durante la inflamación hay un aumento de síntesis de Pgs dependientes de la COX-2 y conjuntamente hay presencia de COX-2 constitutiva a nivel de la zona dorsal de la médula.

PRESENTACIÓN:

Gotero de 10 mL
Gotero de 30 mL



www.laboratoriosprovet.com

Provet

Eficacia ante todo.